

Liens entre les services de PTME et accès au diagnostic pédiatrique précoce *(difficultés rencontrées et solutions)* *Exemple du Mali*

*Pr Mariam Sylla
Département de Pédiatrie, CHU Gabriel
Touré, Bamako*

Contexte

- 9 régions administratives
- Superficie : 1,241,238 km²
- Population : 14 518 000 Habitants
- Femmes = 52%
- Moins de 5 ans = 22,5%
- Prévalence VIH = 1,3%



Rapport PMTE 2010

Indicateurs	2010
Nouvelles femmes vues en CPN	178 862
Femmes enceintes conseillées	164 194 (91%)
Femmes enceintes testées	110 085 (67,4%)
Femmes enceintes séropositives	2 100 (2%)
Femmes enceintes VIH + mises sous ARV	1 284 (61%)
Nouveaux nés de mère séropositives	1 311
Nouveaux nés ayant reçu une prophylaxie	984 (75%)

Suivi des enfants exposés au VIH

- **Traitement de la mère:** ARV à visée prophylactique à partir de la **14^{ème} SA**
- **Prophylaxie de l'enfant**
 - Si mère traitée: **NVP Du + AZT** pendant 14 jours
 - Si mère non ou mal traitée: **NVP Du + AZT + 3TC** pendant 1 mois
- **Alimentation de l'enfant: choix de la mère**
 - Allaitement protégé (ARV pour la mère)
 - Alimentation artificielle à la charge des parents
- **Vaccination :** calendrier PEV


Traitement des enfants infectés

- Régime
 - Moins de 2 ans : 2 INTI + 1 IP
 - Plus de 2 ans : 2 INTI + 1 INNTI
- Acceptabilité des antirétroviraux
 - Kaletra +++
- Suivi des enfants
 - 1553 enfants sous ARV et suivis réguliers (6% des adultes)

Accès au diagnostic pédiatrique précoce du VIH

- Disponibilité de la PCR/ADN et charge virale
 - 53 sites de prélèvement sur papier buvard
 - 2 PCR : 1 mois et 3 mois
- Disponibilité des résultats
 - Délai de rendu des résultats 2 à 4 semaines
 - En 2010: 1029 enfants ont bénéficié d'au moins une PCR
 - 753 ont reçu une prophylaxie avec 25 positifs

Circuits des échantillons et des résultats



Difficultés

- Insuffisance de couverture en services (21%)
- Disponibilité des intrants (ruptures ++++)
- Insuffisance de ressources humaines
- Faible Fréquentation des services
- Mauvaise organisation des services
- Difficulté de Rétention dans le suivi

Couverture en services

Régions	Nbre sites PTME	Nbre Sites Dg précoce	Nbre sites PEC pédiatrique
Kayes	29	02	08
Koulikoro	45	02	10
Sikasso	44	13	10
Ségou	55	12	10
Mopti	31	00	11
Tombouctou	22	00	04
Gao	18	00	02
Kidal	03	00	0
Bamako	60	24	13
TOTAL	307	53	68

Quelle stratégie pour aller vers l'élimination de la TME du VIH?

- Augmentation de la couverture en services
- Intégration des activités dans les activités de routine
- Renforcer le dépistage et PEC des femmes enceintes
- Extension du diagnostic précoce
- Délégation de tâches

Conclusion

- Élimination de la transmission mère-enfant ? **OUI c'est possible**