



Attitudes face au test : informer le conjoint ou pas ?

Enjeux et stratégies de femmes dans un programme de recherche en PTME à Abidjan

Annabel DESGRÉES du LOÛ , IRD, CEPED,
Paris


ETME – 16-17 novembre 2011

**Atelier « Atteindre l'élimination en travaillant
avec les communautés »**

- › Dépistage prénatal du VIH à Abidjan, Côte d'Ivoire
- › Cadre : un programme de recherche sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH (2001-2006)
- › Conseil et Dépistage gratuit proposé aux femmes enceintes, mais aussi à leur conjoint ou partenaire et tous les membres de leur famille pendant toute la durée du programme
- › Femmes en couple (>95%) → **quel partage avec le conjoint autour de ce dépistage prénatal ?**
Conséquences ?
- › Deux groupes suivis pendant 2 ans :
 - » 590 femmes VIH+
 - » 400 femmes VIH-

- › **Les femmes informant-elles leur conjoint/partenaire qu'elles ont été dépistées pour le VIH pendant une consultation prénatale ?**

Proportion de partenaires informés du dépistage VIH et réactions



Quand les femmes dépistées en informent-elles leur partenaire ?

- › Femmes VIH- :
 - » juste après le dépistage, pendant la grossesse

 - › Femmes VIH+ :
 - » Entre le dépistage et l'accouchement
 - » Au moment de la reprise des rapports sexuels
 - » Au moment du sevrage de l'enfant
- Aux moments clés où il y aura des décisions à prendre**
- Pour l'alimentation de l'enfant**
 - Pour la protection des rapports sexuels**


- › Désir des femmes d'informer leur partenaire, même chez celles qui ne l'ont pas fait : « *Comme on est ensemble, on doit tout se dire* »
- › Suivre les conseils de prévention en cachette du partenaire est difficile

MAIS :


- › Peur du rejet du partenaire
- › Aide d'une tierce personne (soignant, assistante sociale) recherchée

› **Après le dépistage prénatal,
les femmes parlent-elles plus
de risque sexuels en général ?**

Communication autour des IST avec le partenaire régulier induite par ce dépistage prénatal



Communication autour des risques sexuels avec le partenaire régulier après le dépistage prénatal



■ Partenaire informé du dépistage (%)

■ avoir suggéré au partenaire de se faire dépister (%)

■ avoir suggéré au partenaire de protéger ses rapports extra conjugaux (%)


Dépistage et échange conjugal : résultats d'entretiens

→ Le dépistage prénatal de la femme et le partage avec son partenaire autour de ce test ou des conseils reçus sont propices à un échange conjugal sur la prévention des risques sexuels, dont le VIH, et sur l'utilisation du préservatif.

Mais cet échange suffit-il à la mise en pratique des conseils reçus ?

› Quel dépistage pour le partenaire ?

Dépistage du partenaire : un succès mitigé



- › Démarche « volontaire » ⇒ plus difficile que pour les femmes
- › Peur de se découvrir infecté
- › **Pensent que le dépistage de leur femme les renseigne sur leur propre sérostatut**
- › Dénier du VIH (rare)

Conséquences de ce faible dépistage des partenaires

- › Difficulté à se protéger d'une éventuelle infection par le VIH dans le cadre conjugal pour les femmes VIH- ⇒ **angoisse**
- › Difficulté à protéger leur partenaire de l'infection pour les femmes VIH+ ⇒ **angoisse (avenir des enfants)**

- › La prévention sexuelle au sein du couple est meilleure lorsque le partenaire est informé et dépisté lui aussi
- › Les partenaires disent souffrir d'un manque d'information sur les risques VIH : information transmise par la femme mais pas reçue en direct - mauvaises compréhensions, angoisses
- › A la question « le dépistage est-il pour vous une affaire de couple ou une affaire individuelle? », femmes et hommes répondent « affaire de couple » (entretiens)

Un risque pour les femmes ?

- › Demande qui émane des femmes aussi
- › Réaction des partenaires généralement positives lorsqu'il sont informés de l'infection de leur femme, mais le risque subsiste

Le devenir des couples après le dépistage

- › Plus de rupture d'union chez les femmes VIH+ (15%) que chez les VIH- (2%) dans les 18 mois après l'accouchement
 - › Rupture non liée au fait que le partenaire soit informé de l'infection de la femme
 - › Rupture liée à
 - » Jeune âge de la femme
 - » Avoir une coépouse
 - » Ne pas résider avec son partenaire
- ⇒ **Les femmes rompraient elles-même des unions fragiles et dans lesquelles elles n'attendent pas un soutien du partenaire ??**

Actuellement, le dépistage prénatal en Afrique est en général proposé seulement aux femmes.

Pourtant, en Côte d'Ivoire :

- Les femmes expriment le désir d'un partage avec leur partenaire sur ce sujet
- Elles demandent parfois aux équipes médicales un soutien pour ce partage
- La réaction des hommes informés est en général positive
- Le dépistage des hommes et la protection des rapports sont meilleurs lorsque le partenaire est informé

Les équipes

- › **Projet DITRAME PLUS Abidjan:**
 - » Volet clinique et épidémiologique coordonné par l'INSERM U 593 (F Dabis – V Leroy)

 - » Volet sciences sociales : IRD – ENSEA (Abidjan)
 - Chercheurs démographes : A Desgrées du Loû, H Brou, B Zanou
 - Chercheur anthropologue : A. Tijou Traoré
 - Assistante sociologue : H. Agbo
 - Ingénieur de base de données : G. Djohan